



Veselības ministrija

Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011, tālr. 67876000, fakss 67876002, e-pasts vm@vm.gov.lv, www.vm.gov.lv

Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā Nr. 01-11.1/5235
Uz 07.10.2021 Nr. 622.12/5-157-13/21

**Latvijas Republikas Saeimas
Prezidijam**

Informācijai: Nacionālajam veselības
dienestam

Slimību profilakses un kontroles
centram

Zāļu valsts aģentūrai

*STEIDZAMI! Par atbilžu sniegšanu
uz Saeimas deputātu jautājumu
Nr. 287/J13*

Veselības ministrija ir saņēmusi un izskatījusi Saeimas administrācijas šā gada 7. oktobra vēstuli Nr. 622.12/5-157-13/21, ar kuru pārsūtīts Saeimas deputātu jautājums "Par vakcināciju pret Covid-19" (jautājuma reģistra Nr. 287/J13) un sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu, Slimību profilakses un kontroles centru un Zāļu valsts aģentūru sniedz šādas atbildes.

1) Cik daudz cilvēku uz atbildes sniegšanas brīdi nav saņēmuši vakcīnas pret Covid-19 otro devu, lai gan tā būtu bijusi jāsaņem?

Informējam, ka 9264 personas nav saņēmušas vakcīnas pret Covid-19 otro devu.

2) Cik un kādās vecuma grupās personas pēc pirmās vakcīnas devas saņemšanas mirušas? Kāds ir bijis oficiālais nāves cēlonis?

Slimību profilakses un kontroles centrs ir apkopojis informāciju no Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāzes un Nacionālā veselības dienesta

vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas par vakcinētajām personām par laika periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. augustam. Datu apkopojumā ir iekļauta informācija par tām personām, kuras ir mirušas no šā gada janvāra līdz augusta mēnesim un kurām bija ievadīta viena vakcīnas deva pret Covid-19. Jāņem vērā, ka līdz šim Latvijā nav apstiprināts neviens nāves gadījums, kurā būtu pierādīta cēloniska saistība ar vakcināciju – visi tālāk norādītie gadījumi norāda tikai uz sakritību laikā un faktos, kad ir iestājusies nāve un ir bijusi vakcinācija.

Reģistrēto nāves gadījumu skaits no šā gada janvāra līdz augustam personām pēc pirmās vakcīnas pret Covid-19 devas saņemšanas sadalījumā pa vecuma grupām un nāves pamatcēloņa grupām

Nāves pamatcēloņa grupa	Vecuma grupa								
	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+	Kopā
Gremošanas sistēmas slimības (K00-K93)			1	1	3	12	6	12	35
Asinsrites sistēmas slimības (I00-I99)		3	4	10	24	69	159	357	626
Audzēji (C00-D48)				3	13	40	79	53	188
Ādas un zemādas audu slimības (L00-L99)			1			1	1		3
Ārēji slimību un nāves cēloņi (V01-Y98)	1	3	2	7	8	5	8	10	44
Citur neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade (R00-R99)						3	3	2	8
Covid-19 un stāvoklis pēc Covid-19 (U07.1, U09.9, U10)				2	5	6	16	25	54
Elpošanas sistēmas slimības (J00-J99)			1	1	2	7	5	9	25
Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības (E00-				2	3	1	9	9	24

E90)									
Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas (Q00-Q99)						1			1
Infekcijas un parazitārās slimības (A00 - B99)					1	2	1		4
Nervu sistēmas slimības (G00-G99)	1		2		2	4	9	7	25
Psihiski un uzvedības traucējumi (F00-F99)				1	1	4	7	15	28
Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības (M00- M99)					1	1	2	2	6
Uroģenitālās sistēmas slimības (N00-N99)			1		1	1	3	17	23
Kopā	2	6	12	27	64	157	308	518	1094

3) *Cik un kādās vecuma grupās personas pēc pirmās vakcīnas devas saņemšanas saslimušas ar Covid-19?*

No vakcinācijas pret Covid-19 ieviešanas pagājušā gada beigās 12250 personas saslimušas ar Covid-19 infekciju pēc pirmās vakcīnas devas saņemšanas.

Personas, kuras saņēmušas pirmo vakcīnas devu pret Covid-19 infekciju un saslimušas, sadalījumā pa vecuma grupām

Vecuma grupa	Skaits
10-19	594
20-29	1276
30-39	2312
40-49	2361
50-59	2215
60-69	1860
70-79	1034
80-89	525
90-99	73
Kopā	12250

- 4) Cik un kādās vecuma grupās personas pēc pirmās vakcīnas devas saņemšanas izvēlējušās nevakcinēties ar attiecīgā ražotāja vakcīnu? Vai šīm personām tiek piedāvāts vakcinēties ar cita ražotāja vakcīnu?

Cilvēki dažādu iemeslu dēļ izvēlas cita ražotāja un tehnoloģijas vakcīnu, lai pabeigtu vakcinācijas kursu – grūtniecības iestāšanās vai apstiprināšana pēc pirmās vakcīnas devas, nelabvēlīga reakcija pēc vakcinācijas, vēlme saņemt cita veida vakcīnu. Tā kā Latvijā ir pieejamas dažādu veidu vakcīnas pret Covid-19, tad cilvēkiem ir iespēja izvēlēties vakcīnu, ar kuru turpināt vakcinācijas kursu.

Personas, kas vakcinējušās ar divām dažādām vakcīnām uz 07.10.2021

1.pote	Comirnaty	Comirnaty	Comirnaty	Spikevax	Spik evax	Spik evax	Vaxzevria	Vaxzevria	Vaxzevria	Kopā
2.pote	Spik evax	Vaxzevria	COVID-19 Vaccine Janssen	Comirnaty	Vaxzevria	COVID-19 Vaccine Janssen	Comirnaty	Spik evax	COVID-19 Vaccine Janssen	
Vecuma grupa										
12-15	5	1		4						10
16-17	3			7						10
18-29	32	8	22	34	2	3	38	4	5	148
30-39	34	9	27	50		6	70	7	9	212
40-49	34	9	20	47	5	6	42	3	10	176
50-59	44	13	27	58	4	8	45	15	17	231
60-69	33	15	12	47	14	11	92	15	16	255
70-79	25	6	12	23	9	3	80	32	34	224
80-89	5	2	3	7	7	3	36	15	20	98
>90	2	1	2		1		4	1	3	14
Kopā	217	64	125	277	42	40	407	92	114	1378

5) Cik un kādās vecuma grupās personas pēc pirmās vakcīnas devas saņemšanas izvēlējušās vakcinācijas kursu neturpināt?

Personu skaits, kuras pēc pirmās vakcīnas devas saņemšanas neturpina vakcinācijas kursu sadalījumā pa vecuma grupām un atkarībā no saņemtās vakcīnas

Vecuma grupa	Saņemtā vakcīna			Kopā
	Comirnaty	Spikevax	Vaxzevria	
12-15	235	7		242
16-17	169	9		178
18-29	1160	105	47	1312
30-39	1342	176	51	1569
40-49	1337	191	48	1576
50-59	1400	204	85	1689
60-69	1007	199	169	1375
70-79	384	120	313	817
80-89	152	53	240	445
>90	15	6	39	60
Kopā	7202	1070	992	9264

Termini 2. devai – saskaņā ar Vakcinācijas rokasgrāmatu: *Comirnaty*: 19 – 42 dienas; *Covid-19 vaccine Moderna*: 21 – 42 dienas; *Vaxzevria*: 3 – 23 nedēļas.

6) Kā atbildīgie dienesti saņem informāciju par novērotām vakcīnas blaknēm pēc pirmās devas saņemšanas, ja persona izvēlas nesaņemt otro devu?

Blakusparādību ziņojumu ārstniecības persona, farmaceits un iedzīvotāji sniedz elektroniski Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnes www.zva.gov.lv sadaļā "[Ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm un biovigilanci](#)".

Šis ziņojums jāsniedz par jebkuru zāļu, arī vakcīnu, iespējamām blakusparādībām, tai skaitā par blakusparādībām gan pēc vakcīnas pirmās, gan pēc otrās devas saņemšanas.

Ārsta un farmaceita pienākums ir ziņot Zāļu valsts aģentūrai par novērotām iespējamām zāļu, to vidū arī vakcīnu, blakusparādībām. Ziņojumu par blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai var iesniegt arī ikviens Latvijas

iedzīvotājs. Pacienti ir aicināti vērsties pie sava ārsta, ja pēc vakcīnas saņemšanas ir veselības traucējumi vai rodas bažas par novērotām iespējamām blakusparādībām.

7) Kādas ir personu minētās blaknes pēc pirmās vakcīnas devas saņemšanas, kuru dēļ personas izvēlas vakcinācijas kursu neturpināt?

Zāļu valsts aģentūra saņem informāciju par vakcīnu iespējamajām blakusparādībām, taču netiek sniegta informācija par iemesliem, kādēļ cilvēks izvēlas neturpināt vakcinācijas kursu. Ir iespējami dažādi iemesli, kādēļ cilvēks izvēlas nesaņemt otro vakcīnas devu, piemēram, izceļošana no valsts, veselības stāvokļa pasliktināšanās u.tml.

Ja cilvēks vakcināciju pret Covid-19 ir veicis pie sava ģimenes ārsta, tad ārstējošais ārsts ir informēts par iemesliem, kādēļ vakcinācijas kurss netiek turpināts. Savukārt, ja vakcinācija ir veikta kādā no masu vakcinācijas centriem, tad iemesli, kādēļ cilvēks izvēlēties neturpināt vakcinācijas kursu, nav zināmi.

Veselības ministrs

(paraksts*)

Daniels Pavļuts

Linda Šeldere 60001573
linda.seldere@vm.gov.lv